

Ampisol

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT AMPISOL

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France

FR/V/3077289 4/1988

Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Zak van 5 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:

ampicilline (als trihydraat) 100 mg

Doeldieren

Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam)

Indicaties

Kalf, big, pluimvee, schaap (lam), geit (lam):

Behandeling en preventie van gastro-intestinale infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig voor ampicilline.

Toediening/dosering

Rund (kalf), varken, schaap (lam), geit (lam):

Oraal via (kunst)melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.

10 mg ampicilline per kg lichaamsgewicht tweemaal daags (overeenkomend met 2 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 2 toedieningen) gedurende 3 tot 5 dagen.

Pluimvee:

Oraal via drinkwater.

20 mg ampicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 200 gram product per 1000 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 dagen.

De hoeveelheid gemediceerd drinkwater, melk of vloeibare voeding opgenomen door dieren is afhankelijk van hun fysiologische en klinische toestand. Ten einde een juiste dosering ampicilline per kg lichaamsgewicht te berekenen, dient de hoeveelheid op te lossen poeder gerelateerd te zijn aan het lichaamsgewicht.

Wachttijd

(Orgaan)vlees: 8 dg

Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren, mag dit product niet gebruikt worden bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.

Contra-indicaties

- gebruik in geval van gekende allergie t.o.v. beta-lactamines;
- toediening aan konijn, cavia, hamster, gerbils.

Bijwerkingen

Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheid reacties veroorzaken (allergie) na toediening. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn (anafylactische shock).

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Voor gebruik steeds oplossen in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, ingestie of huidcontact.

Overgevoeligheid voor penicillinen kan kruisreacties veroorzaken met cefalosporines en vice versa. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor β -lactam antibiotica moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van contact met de ogen, was overmatig met water en win deskundig medisch advies in en toon de bijsluiter. Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet van toepassing.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.