

Aspirine 50 Coophavet

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT ASPIRINE 50 COOPHAVET

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France
FR/V/5748318 2/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Pot van 1 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:
acetylsalicylzuur 0,5 g

Doeldieren

Rund (kalf), varken, pluimvee, paard,
schaap (lam), geit (lam)

Indicaties

**Rund (kalf), varken, pluimvee, paard,
schaap (lam), geit (lam):**

Symptomatische behandeling van
koorts en lichte tot matige pijn.

Toediening / dosering

**Rund (kalf), varken, pluimvee, paard,
schaap (lam), geit (lam):**

Oraal via de melk, vloeibare voeding of
drinkwater.

30 tot 50 mg acetylsalicylzuur per kg
lichaamsgewicht per dag verdeeld over
één of twee toedieningen per dag (over-
eenkomend met 0,6 g tot 1 g product
per 10 kg lichaamsgewicht per dag)
gedurende 2 tot 3 dagen.

Wachtijd

Varken, pluimvee: (orgaan)vlees: 1 dg

**Kalf, paard, schaa (lam) en geit
(lam):** (orgaan)vlees: 7 dg

Eieren: Bij een afwezigheid van een
wachtijd voor eieren, niet gebruiken
bij kippen die eieren voor humane
consumptie produceren, in een tijd-
spanne van 4 weken voor de leg en
tijdens de leg.

Contra-indicaties

- gekende overgevoeligheid voor salicylaten;
- gebruik bij aanwezigheid van gastro-intestinale ulcera;
- gebruik bij verhoogd bloedingsrisico.

Bijwerkingen

Hemorragische syndromen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte.

Zorg voor een volledige bescherming van de handen en de slijmvliezen van de luchtwegen.

Ingeval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met veel water.

Ingeval van symptomen na contact met het product (rode huid) vraag raad aan de huisarts en toon de bijsluiter, Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsproblemen zijn ernstigere symptomen die onmiddellijke medische behandeling vereisen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Acetylsalicylzuur veroorzaakt embryo-toxische en teratogene effecten bij laboratoriumdieren.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie bij de doeldieren.

Gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gebruiken samen met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Verhoogde bloedingsneiging voornamelijk bij dieren in de postpartum periode.

Bewaarcondities / houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar. Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.