



ORION
PHARMA
ANIMAL HEALTH

Gedaan met verstoppen

Bonqat[®]

Het eerste geregistreerde geneesmiddel voor de verlichting van acute angst en ongerustheid bij katten geassocieerd met vervoer en dierenartsbezoeken

Verkorte bijsluiter ¹

BONQAT 50 MG/ML DRANK VOOR KATTEN

WERKZAME STOF: Pregabaline (pregabalin) 50 mg/ml. **DOELDIERSOORTEN:** kat. **INDICATIES VOOR GEBRUIK:** Verlichting van acute ongerustheid en angst geassocieerd met vervoer en dierenartsbezoeken. **DOSERING EN TOEDIENINGSWEG:** Bonqat® wordt oraal toegediend als een eenmalige dosis van 5 mg/kg lichaamsgewicht (0,1 ml/kg lichaamsgewicht) ongeveer 1,5 uur voor het begin van het vervoer/geplande dierenartsbezoek. **CONTRA-INDICATIES:** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK:** Vermijd contact met huid, ogen of slijmvliezen. Was de handen grondig onmiddellijk na toediening van het diergeneesmiddel. **BIJWERKINGEN:** Verschijnselen van sedatie (gekenmerkt door lethargie, afwijking van de proprioceptie en ataxie) en emesis zijn in klinische studies vaak waargenomen. Spiertrilling, mydriase, anorexie, gewichtsverlies en leukopenie zijn in klinische studies soms gemeld. Speekselvorming is zelden gemeld in klinische studies. Gewoonlijk zijn de klinische symptomen mild en van voorbijgaande aard. Meer details, zie SKP. **KANALISATIE:** UDA - REG NL 126815

Bronnen

1. Bonqat SKP
2. Mariti C, Guerrini F, Vallini V, et al. **The perception of cat stress by Italian owners.** J Vet Behav 2017; 20: 74-81.
3. Rodan I, Sundahl E, Carney H, et al. **AAFP and ISFM Feline-Friendly Handling Guidelines.** J Feline Med Surg 2011; 13: 364-375
4. Mariti C, Bowen JE, Campa S, et al. **Guardians' Perceptions of Cats' Welfare and Behavior Regarding Visiting Veterinary Clinics.** J Appl Anim Welf Sci 2016; 19: 375-84.
5. Volk JO, Felsted KE, Thomas JG, et al. **Executive summary of the Bayer veterinary care usage study.** JAVMA 2011; 238: 1275-82.
6. Mico JA and Prieto R. **Elucidating the mechanism of action of pregabalin: alpha(2)delta as a therapeutic target in anxiety.** CNS Drugs 2012; 26: 637-48.
7. Brocbrader HN, Radulovic LL, Posvar EL, et al. **Clinical pharmacokinetics of pregabalin in healthy volunteers.** J Clin Pharmacol 2010; 50: 941-50.
8. Adrian D, Papich MG, Baynes R, et al. **The pharmacokinetics of gabapentin in cats.** J Vet Intern Med. 2018; 32: 1996- 2002.



Het eerste angstverlichtende geneesmiddel voor katten

- Verlicht acute angst en ongerustheid veroorzaakt door vervoer en dierenartsbezoeken.
- Het actieve ingrediënt pregabaline vermindert de afgifte van verschillende neurotransmitters die betrokken zijn bij de pathofysiologie van angst.
- De dosering van Bonqat® is 5 mg/kg lichaamsgewicht = 0,1 ml/kg oraal.
- De snelwerkende formule werkt binnen 1,5 uur.
- De werking houdt tot 7 uur aan, lang genoeg om de kat naar de kliniek en terug te brengen.
- Maakt reizen en kliniekbezoeken minder stressvol voor de kat, de eigenaar en de dierenarts.
- Maakt betere levenslange diergeneeskundige zorg voor de kat mogelijk.



Speciaal afgestemd op katten

Vloeibare formule


Klein doseringsvolume

Gebruiksvriendelijk

Pregabaline verlicht angst bij katten

Pregabaline is een structureel analoog van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA). Het bindt zich aan de alfa-2-delta subeenheid van de spanningsgevoelige calciumkanalen die zich bevinden aan de presynaptische uiteinden van neuronen in de hersenen en het ruggenmerg. Daar vermindert het de afgifte van verschillende neurotransmitters (glutamaat en monoaminerge neurotransmitters) die betrokken zijn bij de pathofysiologie van angst. Dat leidt tot een afname van angst en de daarmee gepaard gaande gedragsymptomen.⁶

Het werkingsmechanisme is vergelijkbaar met dat van gabapentine, maar pregabaline is krachtiger⁷, de absorptie is iets sneller en de eliminatietijd is langer bij katten.^{1,8}



Dosering



- Bonqat® wordt oraal toegediend als eenmalige dosis van **0,1 ml/kg (5 mg/kg lichaamsgewicht)** ongeveer 1,5 uur voor het begin van het vervoer/geplande dierenartsbezoek.
- Kan rechtstreeks oraal worden toegediend of met een kleine hoeveelheid voedsel worden gemengd. Grote hoeveelheden voedsel kunnen het begin van de werking vertragen.

Verpakking



- Bonqat® zit in een glazen flesje en bevat 2 ml product, wat neerkomt op 5 doses voor een kat van gemiddelde grootte (4 kg).
- Een 1 ml orale spuit is bijgesloten in de doos voor een vlotte toediening van het product.

Bewaren en houdbaarheid



- Bewaren in de koelkast (2 °C-8 °C).
- Kan gedurende korte tijd (maximum 1 maand) op kamertemperatuur bewaard worden (15-25 °C).
- Na openen gebruiken binnen 6 maanden.

Bonqat®
verlicht acute
ongerustheid
en angst
geassocieerd
met vervoer
en dierenarts-
bezoeken.

**Dierenarts-
bezoeken**
worden veili-
ger, minder
stressvol en
aangenamer
voor de kat,
de eigenaar en
de dierenarts.

**Meer katten
krijgen
regelmatige
diergenees-
kundige zorg.**

**De algemene
gezondheid
en het welzijn
van katten
verbetert.**

Angst bij katten is een kwestie van welzijn

Angst is een groot obstakel voor katten om naar de dierenarts te gaan en de reguliere zorg te krijgen die elke kat verdient.

59% van de katten vertoont tekenen van onrust tijdens autoritten²

66% van de katten vertoont tekenen van onrust tijdens een bezoek aan de dierenarts²

De onbekende omgeving, vreemde mensen, harde geluiden of een ruwe behandeling in de dierenartspraktijk kunnen een angstige reactie veroorzaken, zelfs bij een gezonde kat³. In het ergste geval kan dit leiden tot een letsel bij de kat, de eigenaar of het diergeneeskundige team.⁴

FEIT:

Katteneigenaren vinden het erg stresserend om hun huisdier naar de dierenarts te brengen, niet alleen voor de kat, maar ook voor zichzelf.⁵



Het ongemak lijkt alleen maar groter te worden bij elke negatieve ervaring⁴. Daar komt nog bij dat katten niet gemakkelijk vergeven: volgens onderzoek bij katteneigenaren zijn katten gedurende meerdere dagen na het bezoek aan de dierenartspraktijk afstandelijk en onvriendelijk.⁵

Fendigo nv/sa, an Alivira Group Company
Av. Herrmann Debrouxlaan 17 | 1160 Brussels | Belgium
mail@fendigo.com



FENDIGO
AN ALIVIRA GROUP COMPANY