


OMEPROGARD

OMEPRAZOLE 370 MG/G PASTA VOOR ORAAL GEBRUIK BIJ PAARDEN



Bewezen klinische werkzaamheid van omeprazol

- In de **behandeling van maagzweren** bij paarden
- Generiek geformuleerd op basis van hetzelfde onderzoek als de originele buerformulering



Nauwkeurige dosering

- 1 spuit kan **700kg** lichaamsgewicht behandelen
- Verdeling per **50kg** dosis mogelijk



Eenvoudige toediening

- **Ergonomische** spuit
- **Kaneel** smaak

■ **Doeldiersoort:** Paard

■ **Samenstelling:** Omeprazol 370 mg/g.

■ **Farmaceutische vorm:** Pasta voor oraal gebruik.
Gladde homogene gele tot geelbruine pasta.

■ **Indicaties voor gebruik:**

Paard: voor de behandeling van maagzweren en preventie van terugkerende maagzweren.

■ **Dosering en toedieningsweg:**

Voor oraal gebruik

Behandeling van maagzweren: één dosis per dag gedurende 28 opeenvolgende dagen met een dosering van 4 mg omeprazol per kg lichaamsgewicht, onmiddellijk gevolgd door een kuur van één dosis per dag gedurende 28 opeenvolgende dagen met een dosering van 1 mg omeprazol per kg lichaamsgewicht, om het terugkeren van maagzweren tijdens de behandeling te verminderen.

Indien maagzweren terugkeren, wordt herhaling van de behandeling in een dosering van 4 mg omeprazol per kg lichaamsgewicht aanbevolen.

Het is raadzaam de behandeling te combineren met veranderingen in houderijsysteem en de training.

Preventie van terugkerende maagzweren: één dosis per dag in een dosering van 1 mg omeprazol per kg lichaamsgewicht. Voor het toedienen van het diergeneesmiddel in de dosering van 4 mg omeprazol/kg, de zuiger van de spuit instellen op de juiste maatverdeling voor het gewicht van het paard. Elke 100 kg dosisverdeling op de zuiger van de spuit geeft voldoende omeprazol af voor het behandelen van 100 kg lichaamsgewicht. De inhoud van één spuit zal een paard van 700 kg behandelen met 4 mg omeprazol per kg lichaamsgewicht.

Voor het toedienen van het diergeneesmiddel in de dosering van 1 mg omeprazol/kg, de zuiger van de spuit instellen op de maatverdeling die overeenkomt met een kwart van lichaamsgewicht van het paard. In deze dosering zal voor elke 100 kg dosisverdeling op de zuiger van de spuit voldoende omeprazol worden afgegeven voor het behandelen van 400 kg lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld voor het behandelen van een paard dat 400 kg weegt, de zuiger instellen op 100 kg. Plaats de dop terug na gebruik.

■ **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

■ **Bijwerkingen:** Paard: Geen bekend. Overgevoeligheidsreacties kunnen echter niet worden uitgesloten. In gevallen van overgevoeligheidsreacties, dient onmiddellijk gestopt te worden met de behandeling.

■ **Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg :** **Dracht en lactatie:** De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie bij het doeldier. Het gebruik van het diergeneesmiddel bij drachtige en lacterende merries wordt niet aanbevolen. Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten.



- **Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten:** Stress (met inbegrip van zware training en competitie), voeding, management en het houderijsysteem kunnen geassocieerd worden met de ontwikkeling van maagzweren bij paarden. Personen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van paarden zouden in overweging kunnen nemen het ontstaan van maagzweren te verminderen door het houderijsysteem aan te passen. Dit kan onder meer worden bereikt door: verminderde stress, verminderd vasten, verhoogde opname van ruwvoer en de mogelijkheid tot grazen. Het diergeneesmiddel dient niet te worden gebruikt bij dieren jonger dan 4 weken oud of die minder wegen dan 70 kg lichaamsgewicht. De dierenarts dient de noodzaak van het uitvoeren van relevante diagnostische tests voorafgaand aan het gebruik van het diergeneesmiddel te overwegen.

- **Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient :** Aangezien dit diergeneesmiddel irritatie en overgevoeligheidsreacties kan veroorzaken, dient direct contact met huid en ogen vermeden te worden. Personen met een bekende overgevoeligheid voor omeprazol of één van de hulpstoffen, moeten het contact met het diergeneesmiddel vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit ondoordringbare handschoenen moeten worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel. Niet eten of drinken tijdens het hanteren en toedienen van het diergeneesmiddel. Was de handen of blootgestelde huid na gebruik. De doseerspuit dient teruggeplaatst te worden in de oorspronkelijke verpakking en passend te worden opgeborgen om toegang door kinderen te voorkomen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met schoon stromend water. Wanneer de symptomen aanhouden dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Personen die een reactie ontwikkelen na contact met het diergeneesmiddel moeten het hanteren van het diergeneesmiddel in de toekomst vermijden.

- **Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:** Omeprazol kan de eliminatie van warfarine vertragen. Omeprazol kan mogelijk benzodiazepinemetabolisme veranderen en effecten op het CZS verlengen. Sucralfaat kan de biobeschikbaarheid van oraal toegediende omeprazol verlagen. Omeprazol kan orale absorptie van cyanocobalamine verlagen. Er wordt geen andere interactie met geneesmiddelen die routinematig worden gebruikt bij de behandeling van paarden verwacht, hoewel de interactie met geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door leverenzymen niet kan worden uitgesloten.

- **Detectietijd:**
FEI: 0 dagen
Racen: 48 uur

- **Wachttijd:**
 - Vlees en slachtafval: 1 dag
 - Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

- **Verdeler:** Laboratoires AUDEVARD, 37/39 rue de Neuilly, 92110 Clichy, Frankrijk.

- **Houder:** Channele Pharmaceuticals, Manufacturing Limited, Loughrea, Co. Galway, Ireland

- **MA number:** REG NL 127502 - BE-V660589

- **Indeling van het diergeneesmiddel :** Diergeneesmiddel op voorschrift.

- **Verpakkingsgrootte:** Kartonnen doos met 7 en 14 spuiten

Samenstelling

Omeprazol 370mg