

Atropine sulfurica 1%

Registratiehouder / Registratienummer

S.C. Romvac Company S.A.
150365 / Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Flacon 20 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie
Heldere, kleurloze oplossing.

Samenstelling

Per ml:
atropine sulfaat 10 mg

Doeldieren

Paarden, runderen, geiten, schapen, varkens, honden, katten en vogels (kip, kalkoen, duif)

Indicaties

- Voor pijnverlichting en peristaltiek, bij enterospasmen, bij darmvaginitis, acute enteritis, slokdarmspasmen en obstructies, bij bronchiale spasmen.
- Als stimulant van het ademhalingscentrum bij morfinevergiftiging.
- Als tegengif bij de intoxicaties met parasymptatomimetica (arecoline, vasoperif, norine, pilocarpine), evenals bij intoxicaties met organofosforpreparaten (neguvon, chlorofos, diazine enz.).
- Ter preventie van cardiale en respiratoire syncope bij anesthesie met vluchtige verdovende middelen.
- Ter vermindering van bronchiale secreties bij andere vormen van algemene anesthesie.

Toediening/dosering

Toedieningswijze:
Subcutaan, maar het kan in ernstige gevallen (bij paarden en runderen) langzaam intraveneus worden geïnjecteerd.

Dosering:

Rund:

Algemeen:

Subcutaan 0,03 - 0,05 g atropine, overeenkomend met 3 - 5 ml product.

Als tegengif bij intoxicatie met parasymptatomimetica:

Subcutaan 0,04 - 0,1 g atropine, overeenkomend met 4 - 10 ml product.

Bronchiale spasmen:

Subcutaan 0,03 - 0,04 g atropine, overeenkomend met 3 - 4 ml product.

Paard:

Algemeen:

Subcutaan 0,03 - 0,05 g atropine, overeenkomend met 3 - 5 ml product.

Vertaling van de originele SPC

Als tegengif bij intoxicatie met parasymptatomimetica:

Subcutaan 0,03 - 0,08 g atropine, overeenkomend met 3 - 8 ml product.

Bronchiale spasmen:

Subcutaan 0,02 - 0,03 g atropine, overeenkomend met 2 - 3 ml product.

Schaap, varken, kalf, veulen, geit:

Subcutaan 0,005 - 0,01 g atropine, overeenkomend met 0,5 - 1 ml product.

Hond, kat, vogel (kip, kalkoen en duif)

Subcutaan, 0,001 - 0,005 g atropine, overeenkomend met 0,1 - 0,5 ml product.

Wachttermijn

0 dagen

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor atropine.

Bijwerkingen

Agitatie of huiduitslag kan in zeldzame gevallen voorkomen.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het product met voorzichtigheid gebruiken bij dieren met nier- en / of leverinsufficiëntie, hoge bloeddruk, chronische bronchitis.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De toediening van het product mag alleen onder veterinair medisch toezicht gebeuren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

De algemene regels voor het vermijden van het biologische risico door het gebruik van naalden en spuiten moet worden gerespecteerd.

In geval van accidentele injectie van het product of van allergieën veroorzaakt door contact met de huid, onmiddellijk een arts raadplegen en de bijsluiter of het etiket tonen. Mensen met een overgevoeligheid voor een van de componenten van het product moeten contact ermee vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Het kan tijdens de dracht, lactatie of de leg worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Onbekend

Belangrijke onverenigbaarheden

Wees voorzichtig bij gebruik met andere alkaloiden (dit kan het effect van atropine versterken of

blokkeren). Fenothiazines (hebben hetzelfde antimuscarinerge effect als atropine) kunnen synergetische effecten veroorzaken op het effect van atropine.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De aanbevolen doseringen dienen in acht te worden genomen. Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: uitdroging van het wangslijmvlies, mydriasis, agitatie en tachycardie. In geval van acute vergiftiging moet symptomatische therapie worden gestart en moeten algemene maatregelen ter ondersteuning van het dier worden genomen.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur beneden 25 °C, in de originele verpakking, onder het regime voor giftige stoffen.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 21 dagen.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.