


Dozuril® 25 mg/ml

Toltrazuril



Eigenschappen:

- Voor de behandeling van coccidiose
- Effectief tegen alle intracellulaire ontwikkelingsstadia van *Eimeria* spp
- Beschikbaar in hersluitbare 1 liter fles

Dozuril® 25 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
NL: REG NL 109266 / URA
BE: BE-V422143 / Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Flacon 1 liter

Farmaceutische vorm

Oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml:
toltrazuril 25 mg

Doeldieren

Kip (opfoklegghen en fokdier)

Indicaties

Kip (opfoklegghen en fokdier)

Behandeling van coccidiose in opfokhennen en vleeskuikenouderdieren

Toediening/dosering

Kip (opfoklegghen en fokdier):

Oraal, via het drinkwater
7 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 28 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag of 1.4 ml product per liter drinkwater), gedurende 2 opeenvolgende dagen. De dosering van 1.4 ml product per liter drinkwater is gebaseerd op een wateropname van 1 liter per 5 kg lichaamsgewicht.

Dit diergeneesmiddel moet of continu gedurende 48 uur toegediend worden, of gedurende 8 uur per dag op twee opeenvolgende dagen

Wachttermijn

Kip (opfoklegghen en fokdier):

(orgaan)vlees: 16 dg

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Goede hygiëne kan het risico op coccidiose verminderen. Daarom wordt aangeraden om als aanvulling op de behandeling de eventuele tekortkomingen in het bedrijf aan te pakken. Pluimveestallen moeten schoon en droog worden gehouden. Het wordt aangeraden om alle dieren in de groep te behandelen. Voor de beste resultaten dient de behandeling gestart te worden voordat klinische symptomen zich door de hele groep hebben verspreid.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Net als met elk antiparasitair middel kan frequent en herhaald gebruik van antiprotozoale middelen uit dezelfde klasse van werkzame bestanddelen en onderdosering door onderschatting van het levend gewicht leiden tot de ontwikkeling van resistentie. Het is belangrijk om u aan de aanbevolen dosis te houden om het risico op resistentie te verminderen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De eerste signalen van intolerantie zoals verminderde wateropname werden waargenomen bij meer dan 5 maal de aanbevolen dosering.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel

Bewaarcondities/houdbaarheid

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.

Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater volgens instructies: 24 uur.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.