

Dozuril® 50 mg/ml

Toltrazuril



Eigenschappen:

- Verkorte wachttijd van 61 dagen
- Coccidiocide effect tegen alle intracellulaire stadia van *Isospora* spp
- Doseerpomp en drenchgun beschikbaar voor eenvoudige orale toediening

Meer informatie: Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Nederland

NL: T: +31 (0)162 582020 - F: +31 (0)162 582025 - cs@dopharma.com - www.dopharma.nl

BE: Filip Timmerman: +32 (0)475 36 77 76 - Geert Van Hecke: +32 (0)496 80 58 16 - cs@dopharma.com - www.dopharma.be

Dozuril® 50 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
NL: REG NL 112775 / URA
BE: BE-V445602

Verpakking

Flacon 250 ml
Flacon 1 000 ml

Farmaceutische vorm

Suspensie voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:
toltrazuril 50 mg

Doeldieren

Varken (big van 3 - 5 dagen oud)

Indicaties

Varken (big van 3 - 5 dagen oud):

Ter voorkoming van klinische symptomen van coccidiose bij neonatale biggen (3 - 5 dagen oud) op bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door *Isospora suis*.

Toediening/dosering

Varken (big van 3 - 5 dagen oud):

Voor orale toediening.
Individuele behandeling van dieren.
Elke big behandelen tussen levensdag 3 en 5, met een enkele orale dosis van 20 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,4 ml orale suspensie per kg lichaamsgewicht. Gezien de lage doseervolumes per individuele big, wordt het gebruik van doseerapparatuur met een graduatie van 0,1 ml aanbevolen.

De orale suspensie schudden voor gebruik.
Het gewicht van de dieren dient nauwkeurig te worden bepaald vóór toediening.
Behandeling tijdens een uitbraak kan voor een individuele big minder waarde hebben, omdat de schade aan de dunne darm al heeft plaatsgevonden.

Wachttermijn

Varken (big van 3 - 5 dagen oud): vlees en slachtafval: 61 dg

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Zoals bij alle antiparasitaire middelen, kan regelmatig en herhaald gebruik van antiprotozoa van dezelfde klasse leiden tot ontwikkeling van resistentie.

Het wordt aangeraden om alle dieren in de groep te behandelen. Hygiënische maatregelen kunnen het risico op coccidiose verminderen. Het wordt daarom aangeraden om tegelijkertijd de hygiënische omstandigheden op het betreffende bedrijf te verbeteren, met name dient het droog en schoon te zijn.

Om maximaal effect te verkrijgen, dienen de dieren te worden behandeld vóór het verwachte begin van klinische symptomen, d.w.z. in de prepatentperiode.

Om het verloop van een aanwezige klinische coccidiose-infectie te wijzigen, kan bij individuele dieren die al symptomen van diarree vertonen, aanvullende ondersteunende therapie nodig zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor toltrazuril moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Vermijd huid- en oogcontact met het diergeneesmiddel.
Was iedere spat op de huid of in de ogen onmiddellijk af met water.
Was de handen na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend, er is bijvoorbeeld geen interactie in combinatie met ijzersupplementen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er werden geen symptomen van intolerantie waargenomen bij biggen tot een drievoudige overdosis.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.