


Dozuril® CT 25 mg/ml

Toltrazuril



Eigenschappen:

- Voor de behandeling van coccidiose bij kip en kalkoen
- Behandeling gedurende slechts 2 dagen
- Beschikbaar in hersluitbare 1 liter fles

Dozuril® CT 25 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V. / REG NL 124126 / URA

Verpakking

Flacon 1 liter

Farmaceutische vorm

Oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml: toltrazuril 25 mg

Doeldieren

Kip (opfokleghen en fokdier), kalkoen

Indicaties

Kip (opfokleghen, fokdier):

- Behandeling van coccidiose veroorzaakt door infecties met diverse *Eimeria* species: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix* en *E. tenella*.

Kalkoen:

- Behandeling van coccidiose veroorzaakt door infecties met diverse *Eimeria* species: *E. adenoides* en *E. meleagrimitis*.

Toediening/dosering

Kip (opfokleghen, fokdier) en kalkoen:

Oraal, via het drinkwater

7 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 28 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 2 opeenvolgende dagen.

Dit diergeneesmiddel moet óf continu gedurende 24 uur toegediend worden, óf gedurende één periode van 8 uur per dag gedurende twee opeenvolgende dagen. Het gemedicineerde water moet elke 24 uur verversd worden.

Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. De dosering moet gebaseerd worden op de huidige, actuele wateropname van de vogels, omdat dit kan variëren met het ras, de leeftijd, de gezondheidsstatus, het beoogd gebruik van de vogels en afhankelijk is van de huisvesting (zoals verschillen in omgevingstemperatuur en lichtschema). Wanneer er gedurende 24 uur continu toegediend wordt, kan de volgende formule gebruikt worden om de hoeveelheid diergeneesmiddel te berekenen die voor behandeling van de vogels aan het drinkwater toegevoegd dient te worden.

$$\frac{0,28 \text{ ml diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag}}{\text{gemiddelde waterconsumptie (liter) per dier per 24 uur}} \times \text{gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren} = \dots \text{ ml diergeneesmiddel per liter drinkwater}$$

Totale benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel per dag (24u): de berekende hoeveelheid (... ml diergeneesmiddel per liter) moet vermenigvuldigd worden met de totale drinkwateropname (L) per dag (24u).

Wanneer er gedurende een periode van 8 uur per dag toegediend wordt, kan de volgende formule gebruikt worden om de hoeveelheid diergeneesmiddel te berekenen die voor behandeling van

de vogels aan het drinkwater toegevoegd dient te worden.

$$\frac{0,28 \text{ ml diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag}}{\text{gemiddelde waterconsumptie (liter) per dier per 8 uur}} \times \text{gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren} = \dots \text{ ml diergeneesmiddel per liter drinkwater}$$

Totale benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel voor een behandelperiode van 8 uur: de berekende hoeveelheid (... ml diergeneesmiddel per liter) moet vermenigvuldigd worden met de totale drinkwateropname (L) per periode van 8 uur. De juiste hoeveelheid oplossing moet dagelijks al roerend toegevoegd worden aan het drinkwater. Om ervoor te zorgen dat alle vogels gelijkmatig water drinken moet voldoende ruimte beschikbaar gemaakt worden bij het drinksysteem. Vogels met vrije uitloop moeten binnen gehouden worden tijdens de behandeling.

Na het beëindigen van de behandeling moet het drinkwatersysteem op de juiste wijze gereinigd worden om blootstelling aan resterende subtherapeutische doseringen te voorkomen, vooral wanneer dit de ontwikkeling van resistentie kan bevorderen.

Verduunningen die sterker geconcentreerd zijn dan 3:1 000 (3 ml diergeneesmiddel op 1 liter drinkwater) kunnen leiden tot precipitatie. Vooroplossing en toediening via een doseerpomp (proportioneerpomp) worden afgeraden. Gebruik bij voorkeur een bulk tank.

Wachtijden

Kip (opfokleghen, fokdier):

vlees en slachtafval: 16 dg

Kalkoen: vlees en slachtafval: 16 dg

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij opfokleghennen na de 15e levensweek.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Hygiëne maatregelen helpen het risico op coccidiose te reduceren. Daarom wordt aangeraden om tijdens de behandeling aandacht te besteden aan hygiëne in pluimveestallen, met name op het gebied van algehele netheid en vochtreductie. Het wordt aanbevolen alle dieren in een groep te behandelen. Voor de beste resultaten dient de behandeling gestart te worden voordat klinische ziektesymptomen zich door de hele groep hebben verspreid.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij doeldiersoorten

Zoals met elk antiparasitair middel, kan frequent en herhaald gebruik van antiprotozoale middelen uit dezelfde klasse van werkzame bestanddelen en onderdosering door onderschatting van het levend gewicht leiden tot de ontwikkeling van resistentie. Het is belangrijk om de aanbevolen dosis aan te houden om het risico op resistentie te minimaliseren. Dit diergeneesmiddel dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met aanvullend

diervoeder of andere diergeneesmiddelen die mogelijk de werkzaamheid van het diergeneesmiddel kunnen beïnvloeden, zoals coccidiostatica en histomonostatica.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel kan irriterend zijn voor de huid, ogen of slijmvliezen. Voorkom contact met de huid en de ogen, inclusief hand-oog contact en hand-mond contact. Draag persoonlijke beschermende kleding, inclusief synthetisch rubberen handschoenen tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel. Was spetters direct met water van de huid of uit de ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel. Was de handen na gebruik. Dit diergeneesmiddel kan overgevoelighedsreacties veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor macrogol 300 moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Dit diergeneesmiddel kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de fokperiode. Uit laboratorium-onderzoek bij ratten en konijnen zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op repro- en embryotoxische effecten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De combinatie van dit diergeneesmiddel met antibiotica kan resulteren in verminderde wateropname bij kalkoenen. Gelijktijdige toediening met andere middelen in het drinkwater moet vermeden worden.

Symptomen van overdosering (en, in voorkomend geval, spoedbehandeling en tegengiffen)

Verminderde drinkwateropname kan het eerste signaal zijn van een overdosering. Dit is uitsluitend waargenomen bij een overdosering van meer dan vijfmaal de aanbevolen dosering.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: fles: 48 maanden.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: can: 36 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.

Houdbaarheid na verduunning volgens instructies: 24 uur.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

