

Equioxx

57mg Firocoxib

57MG FIROCOXIB KAUWTABLET VOOR PAARDEN



De eerste NSAID
in tabletvorm voor
paarden.



1 tablet is
effectief voor
24 uur.



Gelijke
werkzaamheid als
fenylobutazon.¹



Unieke COX-2
selectieve NSAID
voor paarden.



■ **Werkingswijze:** Firocoxib is een niet steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID), behorende tot de Coxibgroep, dat werkt door een selectieve inhibitie van de cyclo-oxygenase 2 (COX-2) gemedieerde prostaglandine synthese. COX-2 is de isoform van het enzym waarvan wordt verondersteld dat het voornamelijk verantwoordelijk is voor de synthese van prostaglandine mediators voor pijn, ontsteking en koorts. In in vitro analyses van het volledige bloed van paarden vertoont firocoxib een 222 tot 643-voudige selectiviteit voor COX-2 t.o.v. COX-1.

■ **Indicaties:** Voor de verlichting van pijn en ontsteking geassocieerd met osteoarthritis en vermindering van de daaraan gerelateerde kreupelheid bij paarden met een lichaamsgewicht tussen 450 kg en 600 kg.

■ **Dosering:** Orale toediening. Dien eenmaal daags één tablet toe aan paarden die 450-600 kg wegen. De duur van de behandeling zal afhankelijk zijn van de respons die wordt gezien maar mag een periode van 14 dagen niet overschrijden.

■ **Aanwijzingen voor een juiste toediening:** Eén tablet moet toegediend worden met een kleine hoeveelheid voer in een emmer of direct uit de hand, waarbij de tablet met een kleine hoeveelheid voer of met een snoepje gepresenteerd wordt. Na toediening wordt aanbevolen de mond te controleren om u ervan te vergewissen dat de tablet wel degelijk werd ingeslikt.

■ **Contra-indicaties:** Niet toepassen bij dieren die lijden aan gastro-intestinale stoornissen en bloedingen, verstoorde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij fokdieren en bij drachtige of lacterende dieren. Niet in combinatie met corticosteroïden of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) gebruiken. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

■ **Bijwerkingen:** Laesies (erosies/ulceraties) van de orale mucosa en van de huid rond de mond werden zeer vaak opgemerkt bij behandelde dieren in tolerantiestudies. Gewoonlijk zijn deze laesies weinig uitgesproken en verdwijnen ze zonder behandeling. Speekselen en oedeem van lippen en tong werden soms geassocieerd met orale laesies in een veldstudie. Alle bijwerkingen dienen te zijn gerangschikt op "frequentie" aan de hand van de volgende indeling, zeer vaak bij (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling): vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren), soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren), zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren), zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

■ **Detectietijd:** 14 dagen.

■ **Wachttermijn(en):** (Orgaan)vlees: 26 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

■ **Verpakkingsgrootte:** • 1 kartonnen doos met 60 tabletten in een 30 ml flacon.
• 1 kartonnen doos met 10 tabletten in blisters.
• 1 kartonnen doos met 60 tabletten in blisters.

■ **Kanaliseringscode:** URA

Samenstelling

Firocoxib 57 mg

1. DOUCET M.Y., and al., Comparison of efficacy and safety of firocoxib and phenylbutazone in horses with naturally occurring osteoarthritis. JAVMA, Vol 232, 1, January 2008.