

Locatim®

Geconcentreerd runderlactoserum bevattende specifieke immunoglobulines G tegen *Escherichia coli* F5 adhesiefactor



Eigenschappen:

- immuun modulerend diergeneesmiddel
- bevat gegarandeerde gehalten aan relevante immunoglobulines
- beschermt pasgeboren kalveren tegen neonatale diarree en helpt bij de behandeling hiervan
- gemakkelijke toediening door de veehouder
 - éénmalig
 - oraal
 - individueel: een flesje per kalf

Meer informatie: Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Nederland

NL: T: +31 (0)162 582020 - F: +31 (0)162 582025 - cs@dopharma.com - www.dopharma.nl

BE: Filip Timmerman: +32 (0)475 36 77 76 - Geert Van Hecke: +32 (0)496 80 58 16 - belgium@dopharma.com - www.dopharma.be

Locatim®

Registratiehouder / Registratienummer

Biokema Europe / REG NL 9804 / UDA
EU/2/99/011/001
CNK (BE): 1511-021

Verpakking

Flacon 60 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Geconcentreerd runderlactoserum
bevattende specifieke immunoglobulines
G tegen *Escherichia coli* F5 (K99)
adhesiefactor $> 2.8 \times 10^6$ /ml

Doeldieren

Rund (pasgeboren kalveren jonger dan
12 uren)

Indicaties

Vermindering van sterfte door entero-
toxicosis, veroorzaakt door adhesiefactor
F5 (K99) bevattende *E.coli*, gedurende de
eerste levensdagen als een aanvulling
op het colostrum van het moederdier.

Toediening/dosering

**Rund (pasgeboren kalf jonger dan
12 uren):**

Orale toediening

60 ml, zo spoedig mogelijk na de
geboorte, bij voorkeur binnen de eerste
4 uren, maar niet later dan 12 uren.

Het middel dient, onverdund of verdund
in melk of een melkvervangend product,
te worden verstrekt zodra het kalf wil
drinken. Als het kalf het middel niet wil
opnemen, kan het met behulp van een
normale injectiespuit in de bek worden
toegediend.

In aanvulling op het middel moet
normaal ander colostrum aan het kalf
worden verstrekt. Aangezien er geen
specifieke gegevens beschikbaar zijn
over de onschadelijkheid van een meer
dan tweemaalige toediening van het
middel, wordt slechts een éénmalige
behandeling aanbevolen.

Wachttermijn

**Rund (pasgeboren kalf jonger dan
12 uren):** (orgaan)vlees: 0 dg

Bijwerkingen

Niet bekend

Speciale waarschuwingen

**Speciale waarschuwingen voor elke
diersoort waarvoor het diergenees-
middel bestemd is**

Het middel wordt vervaardigd van
colostrum van koeien welke onder prak-
tijkomstandigheden worden gehouden.
Derhalve bevat het, naast antistoffen
tegen *E.coli* F5 (K99) adhesiefactor, ook
antistoffen tegen andere organismen
en/of virussen als gevolg van
vaccinatie en/of natuurlijke infectie van
de donorkoeien. Hiermee dient rekening
te worden gehouden bij voorgenomen
vaccinatie van kalveren welke met dit
middel zijn behandeld.

**Speciale voorzorgsmaatregelen voor
gebruik bij dieren**

Dit middel kan antistoffen tegen bovine
virusdiarree virus bevatten

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het middel is niet bedoeld voor gebruik
tijdens dracht en lactatie

**Interacties met andere geneesmiddelen
en andere vormen van interactie**

Er is geen informatie beschikbaar over
de veiligheid en werkzaamheid van dit
immunologisch diergeneesmiddel bij
gebruik in combinatie met enig ander
diergeneesmiddel. Ten aanzien van het
gebruik van dit immunologisch dier-
geneesmiddel vóór of na enig ander
diergeneesmiddel dient per geval een
besluit te worden genomen.

**Overdosering (symptomen, procedures
in noodgevallen, antidota)**

Na toediening van een dubbele dosering
is een tijdelijke verhoging van de
lichaamstemperatuur en ademhalings-
frequentie waargenomen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht
naar de onverenigbaarheid, moet het
middel niet met andere diergeneesmid-
delen worden vermengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C).

Bewaar flacon in de buitenverpakking.

Niet in de vriezer bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel
in de verkoopverpakking: 30 maanden.

Lees voor de complete productinformatie
de SPC.

