

Melovem[®] 15 mg/ml

Meloxicam



Eigenschappen:

- Orale suspensie voor paarden
- Induceert verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat
- Tot 14 dagen behandelen mogelijk, dankzij de preferentiële inhibitie van COX-2 door meloxicam
- Toegelaten voor paarden voor de slacht: wachttijd vlees 3 dagen
- Unieke verpakking inclusief een spuit met verdeling op basis van kg lichaamsgewicht

Voor meer informatie: Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Nederland

NL: +31 (0)162 582020 - cs@dopharma.com - www.dopharma.nl

BE: Filip Timmerman: +32 (0)475 36 77 76 - Geert Van Hecke: +32 (0)496 80 58 16 - cs@dopharma.com - www.dopharma.be

Melovem[®] 15 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
EU/2/09/098/009; REG NL 130316

Verpakking

Fles 250 ml
CNK (BE): 4741-138

Farmaceutische vorm

Orale suspensie

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 15 mg

Doeldieren

Paard

Indicaties

Paard:

- Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Toediening/dosering

Paard:

Dient te worden toegediend gemengd met voer of direct in de mond, met een dosering van 0,6 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 4 ml per 100 kg lichaamsgewicht), éénmaal per dag, tot maximaal 14 dagen.

Als het diergeneesmiddel gemengd wordt met voer, dient het te worden toegevoegd aan een kleine hoeveelheid voer en moet het vóór de rest van het voer gegeven worden.

De suspensie dient te worden gegeven met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht.

Goed schudden voor gebruik. Sluit na toediening van het diergeneesmiddel het flesje door de dop erop te doen, spoel het maatspuitje met warm water en laat het drogen. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

Wachtijd

Paard: vlees en slachtafval: 3 dagen
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Contraindicaties

- Gebruik bij drachtige of lacterende merries.
- Gebruik bij paarden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.
- Gebruik bij paarden jonger dan 6 weken.
- Gebruik bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Diarree, een bijwerking kenmerkend voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), is zeer zelden waargenomen tijdens klinisch onderzoek.

Dit klinische symptoom was reversibel. Vermindering van de eetlust, lethargie, buikpijn, colitis en urticaria zijn zeer zelden gemeld op basis van veiligheidservaring na markttoelating.

Anafylactische reacties, welke ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn, zijn zeer zelden waargenomen op basis van veiligheidservaring na markttoelating. Deze reacties dienen symptomatisch te worden behandeld.

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico op nefrotoxiciteit.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Dit diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen, direct goed uitspoelen met water.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Uit laboratoriumonderzoek bij runderen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.

Er zijn echter geen gegevens over paarden. Daarom wordt het gebruik bij paarden niet aanbevolen tijdens dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere NSAID's geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antiodota)

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren. Na eerste opening bewaren beneden 25 °C. Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

