

Melovem[®] 30 mg/ml

Meloxicam



Eigenschappen:

- NSAID, met anti-endotoxische eigenschappen
- Geregistreerd voor gebruik bij rund en varken
- De enige hoog geconcentreerde meloxicam injectievloeistof voor varken in Europa
- Beschikbaar in 50 ml en 100 ml flacons
- Unieke registratie van Dopharma

Meer informatie: Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Nederland

NL: T: +31 (0)162 582020 - F: +31 (0)162 582025 - cs@dopharma.com - www.dopharma.nl

BE: Filip Timmerman: +32 (0)475 36 77 76 - Geert Van Hecke: +32 (0)496 80 58 16 - cs@dopharma.com - www.dopharma.be

Melovem® 30 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V. EU/2/09/098/005
(50 ml) EU/2/09/098/006 (100 ml)
NL: REG NL 112952 / URA
BE: CNK 3086-535 (50 ml) / CNK 3086-519
(100 ml) / Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Flacon 50 ml
Flacon 100 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 30 mg

Doeldieren

Rund, varken

Indicaties

Rund:

- acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee;
- diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee;
- als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie;
- verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varken:

- niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen;
- als aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinaemie (mastitis-metritis-agalactiesyndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Toediening/dosering

Rund:

Subcutaan
0,5 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,5 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.

Varken:

Intramusculair
0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, waar nodig in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik. Wanneer groepen dieren worden behandeld, wordt het gebruik van een opzuignaald aangeraden om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. Het maximaal aantal maal aanprikken dient beperkt te worden tot 20 keer.

Wachttermijn

Rund: (orgaan)vlees: 15 dg
melk: 5 dg

Varken: (orgaan)vlees: 5 dg

Contra-indicaties

- een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen;
- aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale lesies;
- overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
- gebruik bij dieren jonger dan één week (voor de behandeling van diarree bij rundvee).

Bijwerkingen

Door rundvee en varkens wordt zowel de subcutane als de intramusculaire toediening goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien. In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling van kalveren met Melovem, 20 minuten voorafgaand aan het onthoornen, vermindert post-operatieve pijn. Melovem alleen geeft onvoldoende pijnverlichting tijdens het onthoornen. Voor het verkrijgen

van voldoende pijnverlichting tijdens operatie is comedatie met een geschikt verdovend middel nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan een potentieel risico op nefrotoxiciteit bestaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Accidentele zelfinjectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticoïden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anti-coagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, mag het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel. Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking: 30 maanden. Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

50 ml



8

100 ml



8