

Mendotizer® 100 mg/ml

Menbuton



Eigenschappen:

- Ondersteunende behandeling bij leverinsufficiëntie en spijsverteringsstoornissen
- Stimulerend en ontgiftend middel voor de lever
- Verhoogt normale niveaus van gal-, pancreas- en peptische secretie met 2 tot 5 keer
- Stimuleert de doorvoer en opname van voeder
- Toediening kan één keer worden herhaald na 24 uur

Mendotizer[®] 100 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
REG NL 129938
BE-V661787/ CNK: 4753-919

Verpakking

Flacon 100 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:
menbuton 100 mg

Doeldieren

Rund, varken, paard, schaap, geit

Indicaties

Stimulatie van lever- en spijsverterings-activiteit bij spijsverteringsstoornissen en leverinsufficiëntie.

Toediening/dosering

Kalf (tot 6 maanden), schaap, geit, varken:
Intraveneus, intramusculair
10 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Rund:

Intraveneus
5 - 7,5 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 15 - 20 kg lichaamsgewicht).

Paard:

Intraveneus, langzame toediening
2,5 - 5 mg menbuton per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 - 40 kg lichaamsgewicht).

Toediening kan indien nodig één keer worden herhaald na 24 uur.
Prik de injectieflacon niet meer dan 20 keer aan.

Wachtijd

Rund, schaap, geit, paard:

Vlees en slachtafval: 0 dg na i.v. toediening
Vlees en slachtafval: 1 dag na i.m. toediening
Melk: 0 dagen

Varken:

Vlees en slachtafval: 0 dg na i.v. toediening
Vlees en slachtafval: 1 dag na i.m. toediening

Contra-indicaties

- overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
- toediening aan dieren met een hartaandoening.

Bijwerkingen

Alle doeldieren:

- na i.v. toediening: kwijlen, tranen, tremoren, spontaan urineren en defecatie (zelden)

Specifiek voor rund:

- na (snelle) i.v. toediening: voorbijgaand omvallen (zelden);
- na i.m. toediening: oedeem, bloeding en necrose op de injectieplaats (zelden);
- anafylactische reacties (zeer zelden).

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

Voor paarden wordt uitsluitend langzame intraveneuze toediening geadviseerd. De intraveneuze toediening moet langzaam worden uitgevoerd (niet minder dan 1 minuut) om bovengenoemde bijwerkingen te vermijden.

Het wordt aanbevolen om intramusculair niet meer dan 20 ml op één toedieningsplaats te injecteren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Accidentele zelfinjectie kan pijn en ontsteking veroorzaken. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiters of het etiket te worden getoond. In het geval van accidenteel huidcontact, spoel het aangetaste gebied met water. Niet eten, drinken of roken tijdens hantering van het diergeneesmiddel. Personen met een bekende overgevoeligheid voor menbuton moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens het laatste trimester van de dracht.

Onverenigbaarheden

Niet toedienen in combinatie met oplossingen die het volgende bevatten: calcium, procainepenicilline, vitamine B-complex

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Diergeneesmiddel op voorschrift.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

