

Némisol injectable

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT NÉMISOL INJECTABLE

Registratiehouder/Registratienummer

Dopharma France
FR/V/5424399 0/1983
Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Flacon 250 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:
Levamisol
(als levamisol hydrochloride) 150 mg

Doeldieren

Rund, varken, schaap

Indicaties

Rund, varken, schaap:

Behandeling van de volgende parasitaire infecties:

Rund en schaap:

Gastro-intestinale nematoden

- *Trichostrongylus* spp
- *Cooperia* spp
- *Ostertagia ostertagi* (uitgezonderd geïnhibeerde larven)
- *Haemonchus* spp
- *Nematodirus* spp
- *Bunostomum* spp
- *Oesophagostomum* spp
- *Chabertia ovina* (schaap)

Longwormen

- *Dictyocaulus viviparus*

Varken:

Gastro-intestinale nematoden

- *Ascaris suum*
- *Strongyloides ransomi*
- *Oesophagostomum* spp

Longwormen

- *Metastrongylus* spp

Toediening/dosering

Rund:

Een éénmalige intramusculaire of intraperitoneale toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 25 ml per dier.

Schaap:

Een éénmalige intramusculaire toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 2,5 ml per dier.

Varken:

Een éénmalige subcutane toediening van 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) met een maximum van 5 ml per dier.

Wachttijd

Rund, varken, schaap:

Vlees en slachtafval: 3 dg

Melk: door afwezigheid van een MRL voor melk, mag dit product niet worden gebruikt:

- in dieren die melk voor humane consumptie produceren;
- tijdens droogstand;
- tijdens de twee maanden voorafgaand aan de partus.

Contra-indicaties

- Bestaande gevallen of gevallen verdacht van resistentie voor levamisol.

Bijwerkingen

Zeer zelden worden neurologische symptomen (tremoren, convulsies), spijsverteringsproblemen (speekselvloed, diarree) en plots overlijden gerapporteerd.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor elke diersoort

Niet gebruiken bij melkvee dat melk voor humane consumptie produceert.

Speciale waarschuwingen voor gebruik bij dieren

Zo accuraat mogelijk het gewicht van het dier inschatten. Resistentie kan zich ontwikkelen na een veelvuldige en frequente toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd alle contact met de huid.

Was handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Studies in laboratoriumdieren (muis, rat en konijn) hebben geen teratogene effecten aangetoond. Geen teratogene of embryotoxische verschijnselen werden gerapporteerd bij rund, varken en schaap.

Het product mag worden gebruikt tijdens de dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering zijn de waargenomen verschijnselen deze die ontstaan na stimulatie van het parasympatische zenuwstelsel: speekselvloed, braken, diarree, polypnoe, ataxie, tremoren en convulsies. Er is al melding geweest van een fatale afloop. De antidota van keuze zijn atropine of glycopyrrolaat.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

Houdbaarheid na opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na opening: niet bewaren boven de 25 °C.