

Neomycine 50 CoopHAVET

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT NEOMYCINE 50 COOPHAVET

Registratiehouder/Registratienummer

Dopharma France
FR/V/0359766 8/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Pot 1 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik.

Samenstelling

Per gram:
neomycine (als neomycine sulfaat)
500 000 IE

Doeldieren

Rund (kalf), schaap (lam), geit (lam),
varken, konijn en pluimvee

Indicaties

Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:

Curatieve behandeling van gastro-intestinale infecties door kiemen gevoelig voor neomycine.

Toediening/dosering

Rund (kalf), varken, schaap (lam), geit (lam), konijn:

Oraal via drinkwater, melk of vloeibare voeding.
20 000 IE - 30 000 IE neomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,4 - 0,6 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag) verdeeld over 2 toedieningen gedurende 3 - 5 dagen.

Pluimvee:

Oraal via het drinkwater.
20 000 IE - 30 000 IE neomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 40 tot 60 gram product per 1 000 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 - 5 dagen.

De hoeveelheid gemedicineerd drinkwater, melk of vloeibare voeding opgenomen door dieren is afhankelijk van hun fysiologische en klinische toestand. Ten einde een juiste dosering neomycine per kg lichaamsgewicht te berekenen, dient de hoeveelheid op te lossen poeder gerelateerd te zijn aan het lichaamsgewicht.

Wachttijd

Rund, schaap, geit:

(orgaan)vlees: 14 dg

Melk: niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Varken en konijn:

(orgaan)vlees: 14 dg

Pluimvee:

(orgaan)vlees: 14 dg

Eieren: 0 dg

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Voor gebruik steeds oplossen in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor aminoglycosiden dienen contact met het product te vermijden. Bij toevallig contact met de ogen, was overmatig met water, win deskundig medisch advies in en toon de bijsluiter/etiket.

Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Studies in laboratoriumdieren hebben geen teratogene effecten aangetoond. De veiligheid van het product is niet geëvalueerd bij de doeldieren.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet-oligurisch nierfalen is de gebruikelijke klinische situatie tijdens vergiftiging met aminoglycosiden; het is over het algemeen omkeerbaar, hoewel genezing kan worden vertraagd. De nierfunctie goed monitoren tijdens de behandeling.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.