

Oedex Sachet 40x20g

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT OEDEX

Samenstelling

Per gram:
trichlormethiazide 12,5 mg
dexamethason 0,25 mg

Doeldieren

Rund, varken, paard

Indicaties

Behandeling van oedeem

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met diabetes mellitus, hyperadrenocorticisme, nierfalen, hartfalen of dieren die lijden aan maagzweren.
Niet gebruiken bij dieren met een infectieuze ziekte, tenzij tegelijkertijd een passende anti-infectieuze therapie wordt gegeven.

Toediening/dosering

Toedieningswijze:
Oraal, na dispersie in water.

Dosering:
0,01 - 0,02 mg dexamethason en 0,5 - 1 mg trichlormethiazide per 1 kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen, volgens het volgende protocol:

Rund en paard:

- de eerste dag: een zakje 's morgens en 's avonds
- de tweede en derde dag: één zakje per dag

Varken:

- de eerste dag: een half zakje 's morgens en 's avonds
- de tweede en derde dag: een half zakje per dag

Wachttermijn

Rund, varken en paard:

Vlees en slachtafval: 6 dagen
Melk: 3 dagen

Bijwerkingen

In geval van langdurig gebruik kunnen corticosteroiden zoals dexamethason iatrogene hypercorticisme, polyuropolydipsie (PUPD), immunosuppressie, boulimia en herdistributie van vetreserves in het lichaam veroorzaken.
Het gebruik van corticosteroiden bij lacterende runderen kan een tijdelijke afname van de melkproductie veroorzaken.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De toediening van corticosteroiden aan het einde van de dracht kan leiden tot vroeggeboorte of abortus bij herkauwers.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de werkzame stoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Zwangere vrouwen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Studies bij laboratoriumdieren hebben embryotoxische effecten voor dexamethason aangetoond. Het gebruik van corticosteroiden bij drachtige dieren wordt niet aanbevolen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Aangezien corticosteroiden het immuunrespons op vaccinatie kunnen verminderen, mag dexamethason niet gelijktijdig met vaccins worden toegediend.
Gelijktijdige toediening van niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen kan het risico op ulceratie van het maagdarmkanaal verhogen.