

Phenoxypen® WSP

Fenoxymethylpenicilline



Eigenschappen

- Voor de behandeling van necrotische enteritis veroorzaakt door *Clostridium perfringens*
- Wateroplosbaar poeder
- Smal spectrum 1e keus antibioticum
- Verkrijgbaar in hersluitbare verpakking van 1 kg en 5 kg
- Wachttermijn van 2 dagen voor vlees en 0 dagen voor eieren

Phenoxypen® WSP

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.

NL: REG NL 10333 / UDD

BE: BE-V292354

Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking / CNK-code

Pot 1 kg / 2586-469

Emmer 5 kg / 4274-049

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:

fenoxymethylpenicilline 293 mg

overeenkomend met fenoxymethylpenicilline

kalium 325 mg

Doeldieren

Kip

Indicaties

Kip:

Voorkomen van mortaliteit op groepsniveau door necrotische enteritis in kippen, veroorzaakt door *Clostridium perfringens* gevoelig voor fenoxymethylpenicilline.

Toediening/dosering

Kip:

Oraal, via het drinkwater

13,5 - 20 mg fenoxymethylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 46 - 68 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 5 dagen.

Met behulp van onderstaande formule kan de hoeveelheid Phenoxypen WSP (in gram) nodig per 1 000 liter water berekend worden:

mg product/ kg lichaamsgewicht/dag	gemiddeld lichaamsgewicht x (kg) per dier	aantal dieren
---------------------------------------	---	------------------

totale wateropname van het te behandelen hok (liter) op de vorige dag

$$= \dots \text{ mg product per liter drinkwater} \\ = \text{g product per 1 000 liter water}$$

Bij het afwegen van de juiste hoeveelheid product wordt het gebruik van gekalibreerde weegapparatuur aanbevolen.

Rekening houdend met het feit dat zieke dieren minder drinken, wordt aanbevolen om de therapie te starten met de hoogste dosering om de mogelijk verminderde drinkwateropname te compenseren.

Om een correcte dosering te garanderen, moet het lichaamsgewicht van de dieren zo accuraat mogelijk bepaald worden, zodat onderdosering vermeden wordt.

De maximale oplosbaarheid is 250 g product per liter drinkwater.

Er mag geen andere bron van drinkwater beschikbaar zijn gedurende de medicatie-

periode.

Bij een veranderde drinkwateropname bij pluimvee dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Wachttermijn

Kip: (orgaan)vlees: 2 dg

ei: 0 dg

Contra-indicaties

- overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel.

Bijwerkingen

Hoewel er geen bijwerkingen werden gezien na het gebruik van het product, kunnen penicillines braken en diarree veroorzaken en kunnen deze de bacteriële flora van de darm wijzigen door selectie van resistente bacteriën. Indien u ernstige bijwerkingen of andere reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De toediening van het product kan leiden tot een verhoogde opname van het geneesmiddel in de drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het product moet gebaseerd zijn op gevoeligheidstesten van bacteriën die zijn geïsoleerd bij kippen welke reeds gestorven zijn op het betreffende bedrijf. Het product moet niet gezien worden als een alternatief voor gebrek aan hygiëne en goed management in de kippenstal.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Fenoxymethylpenicilline kan overgevoelighedsreacties oproepen na injectie, inademing, opname door de mond of door huid- of oogcontact.

Overgevoeligheid voor fenoxymethylpenicilline kan leiden tot kruisovergevoeligheid voor andere penicillines en cefalosporinen en omgekeerd.

Allergische reacties veroorzaakt door deze stoffen kunnen soms ernstig zijn.

In geval van accidentele inname of ernstige symptomen van overgevoeligheid zoals huiduitslag door blootstelling, zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeilijkheden met de ademhaling, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen en de bijsluiter aan de arts te tonen. Mensen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines of cefalosporinen moeten contact met dit middel vermijden. Indien u overgevoelighedsreacties

vertoont na contact met dit middel, moet u verder contact met dit middel (en middelen die andere penicillines of cefalosporinen bevatten) vermijden.

Wees voorzichtig met dit middel om blootstelling te vermijden, neem daartoe de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht. Draag beschermende kleding, ondoordringbare handschoenen en een wegwerp stofmasker conform de Europese Standaard EN 149 of een niet wegwerp stofmasker conform de Europese Standaard EN 140 met een filter conform EN 143 tijdens het mengen en het gebruik van het product. Was de handen onmiddellijk na gebruik.

Gebruik tijdens leg

Uit studies met laboratoriumdieren en mensen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op effecten op voortplantingsfuncties of op foetale ontwikkeling.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Fenoxymethylpenicilline heeft een hoge therapeutische index. Na toediening van geneesmiddel drinkwater in een 2- en 5-voudige overdosering gedurende tweemaal de geadviseerde behandelingsduur werden geen bijwerkingen vastgesteld. Bij sommige dieren leidde de toediening van vijfmaal de geadviseerde dosering gedurende tweemaal de geadviseerde behandelingsduur tot een toename van de waterconsumptie, een vermindering van de voederopname en waterige mest.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met andere diergeneesmiddelen. Contact van penicilline oplossingen met metaal en het gebruik van metalen drinkwatersystemen kunnen de stabiliteit van penicilline negatief beïnvloeden. Daarom wordt het gebruik van zulke systemen afgeraden en dienen deze niet gebruikt te worden om oplossingen in te bewaren.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Beschermen tegen vorst.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.

Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.