



NEXPRAZ DUO®



- Kan toegediend worden aan **VEULENS** (ouder dan 2 weken) en dragende en zogende **MERRIES**
- **GEMAKKELIJKE TOEDIENING:** korte 8cm doseerspuit



LABORATOIRES
AUDEVARD
Veterinary Expertise & Guarantees

NEXPRAZ DUO®

Ivermectine 18,7 mg, Praziquantel 140,3 mg • Pasta voor oraal gebruik voor paarden



Indicaties voor gebruik:

Voor de behandeling van gemengde infestaties van cestoden en nematoden of geledpotigen veroorzaakt door volwassenen of ontwikkelingsstadia van nematoden, longwormen, paardenhorzellarven en lintwormen bij paarden.

Dit diergeneesmiddel is alleen geïndiceerd als gelijktijdig gebruik tegen nematoden, paardenhorzellarven en lintwormen is geïndiceerd.

Nematoden:

Grote strongyliden: *Strongylus vulgaris* (volwassenen en arteriële larven L4), *Strongylus edentatus* (volwassenen en weefselarven L4), *Strongylus equinus* (volwassenen), *Triodontophorus* spp. (volwassenen)

Kleine strongyliden: *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Gyalocephalus* spp. (volwassenen en niet-geïnhibeerde slijmlarven)

Spoelwormen: *Parascaris equorum* (volwassenen en larven)

Aarsmaden: *Oxyuris equi* (larven)

Haarwormen: *Trichostrongylus axei* (volwassenen)

Veulenwormen: *Strongyloides westeri* (volwassenen)

Maagwormen: *Habronema* spp. (volwassenen)

Nekwormen: *Onchocerca* spp. microfilariae, d.w.z. huid-onchocerciasie

Longwormen: *Dictyocaulus arnfieldi* (volwassenen en larven).

Cestoden: *Anoplocephala perfoliata* (volwassenen).

Paardenhorzels: *Gasterophilus* spp. (larven)

Wachttermijn:

Vlees en slachtafval: 35 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

NL : REG NL 129847

BE : BE-V662567

Dosering:

Eenmalige toediening van 200 µg ivermectine en 1,5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 1,07 g pasta per 100 kg lichaamsgewicht. Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden en de juiste dosis af te meten om onderdosering te voorkomen, wat het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen anthelmintica kan verhogen. De eerste portie pasta is voldoende om dieren met een lichaamsgewicht

van 100 kg te behandelen. Elk extra deel van de applicator zorgt voor een voldoende hoeveelheid pasta voor 50 kg lichaamsgewicht. Stel de applicator in op basis van de berekende dosis door de ring naar de overeenkomstige markering te verplaatsen. Een applicator met 7,49 g pasta biedt voldoende pasta om een paard van 700 kg met de aanbevolen dosering te behandelen.

Toediening:

De pasta wordt oraal toegediend.

Stel de applicator vóór toediening in op de berekende dosis door de ring naar de overeenkomstige markering te verplaatsen. De pasta wordt oraal toegediend via de interdental ruimte op de tongbasis. De mond van het dier mag geen voedselresten bevatten. Til onmiddellijk na toediening het hoofd van het paard een paar seconden op om ervoor te zorgen dat de dosis goed wordt doorgeslikt. Om een adequaat niveau van preventie tegen infectie met lintwormen en rondwormen te bereiken, is het noodzakelijk veterinair advies te verstrekken over juiste dosering en houderij.

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij veulens jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulpstoffen.

Bijwerkingen:

Paard: Zeer zelden (< 1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): Anorexie¹, Koliek¹, Diarree¹, Allergische reactie (zoals allergisch oedeem², slijmvliescongestie, hypersalivatie, tachycardie, tongoedeem, urticaria). Onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): Jeuk², Zwelling².

Diergeneesmiddel op voorschrift.

Verdeler:

Audevard, 37/39 rue de Neuilly, 92110 Clichy (France)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Bioveta, a.s, Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tsjechië.



NEXPRAZ DUO 18,7 mg/g + 140,3 mg/g

Pâte orale • Pasta voor oraal gebruik • Paste zum Eingeben • Oral pasta

Ivermectine 18,7 mg/g & Praziquantel 140,3 mg/g • Ivermectin 18,7 mg/g & Praziquantel 140,3 mg/g • Ivermectinum 18,7 mg/g & Praziquantelum 140,3 mg/g

BE Chevaux Lire la notice avant NL BE Paard Lees vóór DE BE Pferd Lesen Sie vor DK Heste Læs indlæssedlen

1x7 ml
bioveta




NEXPRAZ DUO



NEXPRAZ DUO 18,7 mg/g + 140,3 mg/g

Pâte orale • Pasta voor oraal gebruik • Paste zum Eingeben • Oral pasta
Ivermectine 18,7 mg/g & Praziquantel 140,3 mg/g • Ivermectin 18,7 mg/g & Praziquantel 140,3 mg/g • Ivermectinum 18,7 mg/g & Praziquantelum 140,3 mg/g



VNR 152247