

Suanovil 50

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT SUANOVIL 50

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France
FR/V/1675316 7/1980

Verpakking

Pot 100 g
Pot 1kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:
spiramycine
als spiramycine adipaat 1.5 MIE
(= 1 500 000 IE)

Doeldieren

Rund (kalf), varken en pluimvee

Indicaties

Rund (kalf), varken en pluimvee:

Bij ziekten veroorzaakt door ziektekiemen die gevoelig zijn voor spiramycine.

Rund (kalf):

- Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door *Mycoplasma* spp en intestinale infecties veroorzaakt door Gram + bacteriën.

Varken:

- Behandeling van respiratoire infecties, mastitis, intestinale infecties, artritis en huidaandoeningen veroorzaakt door Streptococci.

Pluimvee:

- Preventie in geïnfecteerd milieu en behandeling van mycoplasmose.

Toediening/dosering

Rund (kalf)

Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 - 5 dagen.

Varken:

Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
100 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,66 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 - 5 dagen.

Pluimvee:

Oraal via het drinkwater
150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per liter drinkwater), gedurende 3 - 5 dagen.

Wachtijd

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 21 dg

Varken: vlees en slachtafval: 21 dg

Pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg

Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren niet gebruiken bij leghennen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij gekende allergieën tegen spiramycine of andere substanties behorende tot de groep van de macroliden.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit poeder is geschikt voor het maken van een oplossing en is bedoeld om te worden opgelost in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater en kan niet als dusdanig gebruikt worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Wees voorzichtig met dit middel om blootstelling te vermijden, neem daartoe de aanbevolen voorzorgs-

maatregelen in acht: het dragen van een stofmasker, een beschermingsbril en beschermingshandschoenen zijn aangewezen. Vermijd het inademen van stof en vermijd contact met de huid en ogen. Zwelling van het gezicht, lippen en ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische hulp.

Vermijd het contact met het product of gesupplementeerde voeding in geval van een gekende voorgeschiedenis van allergie voor spiramycine.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Geen teratogene effecten zijn gerapporteerd uit proeven uitgevoerd bij muizen. Embryotoxische effecten werden waargenomen bij konijnen, maar bij maternotoxische orale doses. De veiligheid van het product is niet onderzocht bij zeugen tijdens dracht en lactatie. Het gebruik ervan tijdens lactatie en dracht lijkt echter geen specifiek probleem te vormen.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.