

T.S.-Sol[®] 20/100

Trimethoprim en sulfamethoxazol



Eigenschappen

- Goede wateroplosbaarheid
- Hoge orale beschikbaarheid
- 1e keus antibioticum voor gebruik bij varken en kip

T.S.-Sol[®] 20/100

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V. / REG NL 7611 / UDD

Verpakking

Can 5 liter

Farmaceutische vorm

Oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml:

trimethoprim 20 mg

sulfamethoxazol 100 mg

Doeldieren

Vleesvarken, vleeskuiken

Indicaties

Vleesvarken:

- Acute of chronische enteritis veroorzaakt door *Salmonella* choleraesuis en een aantal andere *Salmonella* species.
- Spondylarree veroorzaakt door β -haemolytische K88-positieve, K99-positieve of 987P *Escherichia coli* stammen.
- Secundaire bacteriële infecties met *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus* spp en *Haemophilus parasuis* optredend bij influenza of Aujeszky.

Vleeskuiken:

- Colibacillosis veroorzaakt door *Escherichia coli*.
- Coryza (acute snot) veroorzaakt door *Haemophilus paragallinarum*.
- Enteritis veroorzaakt door *Salmonella enteritidis* en andere *Salmonella* spp.

Toediening/dosering

Vleesvarken:

Oraal, via drinkwater

5 mg trimethoprim en 25 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 4 - 7 dagen.

Vleeskuiken:

Oraal, via het drinkwater

7,5 mg trimethoprim en 37,5 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Vleesvarken: (orgaan)vlees: 8 dg

IKB: 8 dg

Vleeskuiken: (orgaan)vlees: 5 dg

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren kunnen een verminderde eetlust en een veranderd drinkpatroon hebben en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Bij een veranderde voeder of drinkwateropname bij vogels dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor trimethoprim en sulfamethoxazol worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe een stofmasker en handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Beschermen tegen vorst.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 12 maanden.

Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: niet bewaren, direct gebruiken.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.