

Trisulmix Poudre

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France
FR/V/0086132 2/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Pot van 1 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:
sulfadimethoxine (als natrium zout)
186,8 mg
trimethoprim 40 mg

Doeldieren

Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn

Indicaties

Aandoeningen veroorzaakt door kiemen gevoelig aan sulfadimethoxine en trimethoprim.

Rund (kalf), pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:

- behandeling en preventie van luchtweginfecties en gastro-intestinale infecties;
- behandeling en preventie van coccidiose.

Varken:

- behandeling en preventie van luchtweginfecties en gastro-intestinale infecties.

Toediening / dosering**Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:**

Oraal via het drinkwater of vloeibare voeding.

18,6 - 37,36 mg sulfadimethoxine en 4 - 8 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 - 2 g per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 - 5 opeenvolgende dagen. De gegeven dosering dient aangepast te worden aan het lichaamsgewicht.

Wachtijd**Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:**

(orgaan)vlees: 12 dg

Eieren: niet gebruiken bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.

Contra-indicaties

- overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim;
- ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen**Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Geef de behandelde dieren tijdens en na de behandeling voldoende water.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Behandel dit product met de nodige zorg dit om risico's bij blootstelling te voorkomen. Bij het hanteren van dit product moeten een mondkapje, een beschermbril en ondoordringbare handschoenen worden gedragen. Vermijd inademing van het poeder en vermijd contact met de huid en de ogen.

Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht. Personen met een bekende overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim moeten contact met het product of de gemedicineerde voeding vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Teratogene en foetotoxische effecten zijn waargenomen bij proefdieren die behandeld zijn met dosissen hoger dan de aanbevolen therapeutische doses. Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht.

Bewaarcondities / houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.

Na opening: bewaren beneden 25 °C.