

Veterelin 0,004 mg/ml

Busereline



Eigenschappen:

- Synthetisch GnRH analoog
- Geregistreerd voor gebruik bij rund, varken, paard en konijn
- Ook geregistreerd voor intraveneuze toediening

Veterelin 0,004 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Laboratorios Calier S.A.

NL: REG NL 108021 / UDD

BE: BE-V395577 CNK: 2886-877 /

Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Doos 5x flacon 10 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:

busereline 0,004 mg

overeenkomend met busereline acetaat

0,0042 mg

Doeldieren

Rund (koe), varken (gelt), paard (merrie), konijn (voedster)

Indicaties

Rund (koe):

- ovulatie-inductie of uitgestelde ovulatie;
- behandeling van anoestrus;
- behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie;
- verhoging van het drachtigheidspercentage na inseminatie, alsook na oestrus synchronisatie met een PGF2 α -analoog; resultaten kunnen variëren afhankelijk van de fokomstandigheden.

Varken (gelt):

- ovulatie-inductie na oestrus synchronisatie met een prostageen-analoog (altrenogest) om een eenmalige kunstmatige inseminatie mogelijk te maken.

Paard (merrie):

- ovulatie-inductie voor een betere synchronisatie van de ovulatie met het tijdstip van dekking;
- behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie.

Konijn (voedster):

- verhoging van het bevruchtingspercentage;
- ovulatie-inductie bij inseminatie postpartum.

Toediening/dosering

Rund (koe):

Intramusculair, intraveneus of subcutaan IM injectie is de meest aangewezen toedieningsweg.

- Behandeling van anoestrus en ovulatie-inductie:
20 μ g busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier), eenmalig.
- Uitgestelde ovulatie:
10 μ g busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig.
- Verhoging drachtigheidspercentage na inseminatie, alsook na oestrussynchronisatie met PGF2 α -analoog:
10 μ g busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig.

Resultaten kunnen echter variëren afhankelijk van de fokomstandigheden.

Voor oestrussynchronisatie bij koeien op basis van een vast 10-daags inseminatie regime, het diergeneesmiddel toedienen op dag 0, gevolgd door PGF2 α behandeling op dag 7, en een tweede behandeling met het diergeneesmiddel op dag 9 volgens de genoemde dosering.

- Behandeling van folliculaire cysten:
20 μ g busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier), eenmalig.

Varken (gelt):

Intramusculair, intraveneus

IM injectie is de meest aangewezen toedieningsweg.

- Ovulatie-inductie na oestrussynchronisatie met prostageen-analoog (altrenogest) om een eenmalige inseminatie mogelijk te maken:

10 μ g busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig. Het diergeneesmiddel toedienen 115 - 120 uur na het einde van synchronisatie met prostageen. Een eenmalige kunstmatige inseminatie uitvoeren 30 - 33 uur na toediening van het diergeneesmiddel.

Paard (merrie):

Intramusculair, intraveneus of subcutaan IM injectie is de meest aangewezen toedieningsweg.

- Behandeling van folliculaire cysten:
40 μ g busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier), eenmalig.
- Ovulatie-inductie voor een betere synchronisatie van de ovulatie met het tijdstip van dekking:
40 μ g busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier), eenmalig.

Konijn (voedster):

Intramusculair, intraveneus of subcutaan IM injectie is de meest aangewezen toedieningsweg.

- Verbetering van het bevruchtingspercentage:
0,8 μ g busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier), eenmalig.
- Ovulatie-inductie bij inseminatie postpartum:
0,8 μ g busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier), eenmalig.

De flacon kan maximaal 20 maal aangeprikt worden.

Wachttermijn

Rund (koe): (orgaan)vlees: 0 dg

melk: 0 dg

Varken (gelt): (orgaan)vlees: 0 dg

Paard (merrie): (orgaan)vlees: 0 dg

melk: 0 dg

Konijn (voedster): (orgaan)vlees: 0 dg

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling met een GnRH-analoog is alleen symptomatisch; de oorzaken van een vruchtbaarheidsstoornis worden niet door deze behandeling weggenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gelten: het gebruik van het product anders dan aanbevolen kan resulteren in de vorming van folliculaire cysten, die de vruchtbaarheid en worpgrootte nadelig kunnen beïnvloeden. Een aseptische techniek wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact van de injectieoplossing met de ogen en huid. In geval van accidenteel contact, grondig met water spoelen. Indien het product met de huid in contact komt dient deze grondig gereinigd te worden met water en zeep aangezien GnRH-analogue producten door de huid geabsorbeerd kunnen worden.

Zwangere vrouwen dienen het product niet toe te dienen, aangezien bij laboratoriumdieren is aangetoond dat busereline foetotoxische eigenschappen heeft. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen het product met de nodige voorzichtigheid toe te dienen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en/of lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na herhaalde toediening van een dosis van 3,5 ml product, kan bij gelten een verminderde voedselconsumptie worden waargenomen na de 2e injectie. Dit effect is van voorbijgaande aard en vraagt geen specifieke behandeling.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

In het donker bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden. Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 uur.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

