


Vitasol®-C 100%

Ascorbinezuur



Eigenschappen:

- Enige in Nederland geregistreerde diergeneesmiddel met een hoge concentratie vitamine C
- Voor gebruik bij rund, varken, pluimvee, hond, kat en cavia
- Toediening via het drinkwater of over het voer
- Wachttermijn vlees, melk, eieren: 0 dagen
- Verkrijgbaar in hersluitbare verpakking van 1 kg

Vitasol[®]-C 100%

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
REG NL 4139 / VRIJ

Verpakking

Pot 1 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per g:
ascorbinezuur 1 000 mg

Doeldieren

Rund, varken, pluimvee, hond, kat, cavia

Indicaties

Alle doeldieren:

Gebrek aan ascorbinezuur.

Toediening/dosering

Alle doeldieren:

Oraal, over het voer of via het drinkwater
5 - 30 mg ascorbinezuur per kg lichaamsgewicht per dag.

Wachttermijn

Rund:	(orgaan)vlees:	0 dg
	melk:	0 dg
Varken:	(orgaan)vlees:	0 dg
Pluimvee:	(orgaan)vlees:	0 dg
	ei:	0 dg

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Ascorbinezuur kan veilig gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toxiciteit van ascorbinezuur is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
In het donker bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

