

Oxymax® 100 mg/ml

Oxytetracycline



Eigenschappen:

- Voor gebruik bij rund (incl. kalf) en varken
- Breed spectrum 1e keus antibioticum
- Wachttermijn vlees: 21 dagen; melk: 5 dagen
- Beschikbaar in flacons van 100 en 250 ml
- Weefselvriendelijke formulering door het gebruik van polyvidone (PVP) als hulpstof*

Oxymax® 100 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma Research B.V.
REG NL 112077 / UDD

Verpakking

Flacon 100 ml
Flacon 250 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:
oxytetracycline 100 mg
als oxytetracycline hydrochloride

Doeldieren

Rund, kalf, varken

Indicaties

Rund, kalf:

- pneumonie en shipping fever geassocieerd met *Pasteurella multocida* en *Mannheimia haemolytica*;
- pneumonie veroorzaakt door *Mycoplasma* spp;
- difterie en panaritium veroorzaakt door *Fusobacterium necrophorum*;
- actinomycose veroorzaakt door *Actinobacillus lignieresii*;
- leptospirose veroorzaakt door *Leptospira* spp;
- Infectieuze bovine keratoconjunctivitis veroorzaakt door *Moraxella bovis*;
- Q-fever veroorzaakt door *Coxiella burnetii*;
- tickborne fever veroorzaakt door *Anaplasma phagocytophilum*;
- anaplasmosis veroorzaakt door *Anaplasma marginale*.

Varken:

- atrofische rhinitis veroorzaakt door *Bordetella bronchiseptica* en *Pasteurella multocida*;
- bronchopneumonie veroorzaakt door *Mycoplasma* spp en *Pasteurella* spp;
- pleuropneumonie veroorzaakt door *Actinobacillus pleuropneumoniae* en *Haemophilus (para)suis*;
- enzoötische pneumonie veroorzaakt door *Mycoplasma hyopneumoniae*;
- enteritis veroorzaakt door *Campylobacter* spp, *Clostridium perfringens* en *Salmonella* spp;
- vlekziekte veroorzaakt door *Erysipelothrix rhusiopathiae*;

- omphalitis veroorzaakt door *Haemophilus* spp;
- artritis veroorzaakt door *Haemophilus* spp, *Mycoplasma* spp en *Streptococcus* spp;
- Glässer's disease veroorzaakt door *Haemophilus parasuis*;
- leptospirose veroorzaakt door *Leptospira pomona*.

Toediening/dosering

Rund (volwassen rund):

Intramusculair
5 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 - 5 dagen.

Kalf, varken:

Intramusculair
10 - 20 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 - 2 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 - 5 dagen.

Maximaal injectievolume per injectieplaats:

Rund (volwassen rund): 15 ml

Kalf: 5 - 10 ml

Varken: 5 - 10 ml

Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Rund: (orgaan)vlees: 21 dg
melk: 5 dg

Kalf: (orgaan)vlees: 21 dg

Varken: (orgaan)vlees: 21 dg
IKB: 21 dg

Contra-indicaties

Nier- en/of leverinsufficiëntie.

Bijwerkingen

Parenterale injecties van tetracyclines kunnen aanleiding geven tot verminderde vruchtbaarheid bij mannelijke dieren. Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties worden waargenomen ten gevolge van weefselirritatie.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor oxytetracycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt, mits er rekening wordt gehouden met de volgende bijwerkingen:

- tetracyclines worden afgezet in het melk- en in het blijvend gebit en kunnen verkleuringen, glazuurhypoplasie en verminderde mineralisatie veroorzaken;
- het product wordt niet aanbevolen gedurende de laatste 2 - 3 weken van de dracht;
- oxytetracycline wordt uitgescheiden in de melk, maar de concentraties zijn relatief laag.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig behandelen met bactericide antibiotica zoals (semi-synthetische) penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd bij de bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Beschermen tegen vorst.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 16 dagen.

* J.F.M. Nouws et al. 1990

Lees voor de complete productinformatie de SPC.

100 ml



250 ml

